

## Pohjois-Intia 17.1.-1.2.2010

Kävimme tammikuun alussa 2010 lintu- ja kuvausretkellä Pohjois-Intiassa seitsemän henkisellä porukallamme. Lisäksi meillä oli mukana intialainen matkanjärjestäjä, autokuski sekä jokaisella kohteella eri paikallisopas.

Matkareittimme jakaantui karkeasti ottaen kahteen osaan: pohjoiseen 17.1.-23.1., jolloin kävimme Kumerian (The Den, Mohan), Corbettin (Dhikala, Kosi River) ja Nainitalin (Pangot, Sat Tal) alueilla sekä etelään 24.1.-1.2., jolloin kävimme Chambalin, Bharatpurin (Keoladeo, Bund Bhareta) ja Ranthambhoren (Soorwal Dam) alueilla.

Lintuja havaittiin kaikkiaan 356 lajia. Alla on pikainen luonnehdinta jokaisesta lajista. Muita eläimiä havaittiin vähintään 32 lajia. Alinna on pikainen luonnehdinta jokaisesta lajista.

### Lista havaituista linnuista:

<b>Mustafrankoliini</b>	Black Francolin	( <i>Francolinus francolinus</i> )
Corbettissa yhtenä päivänä viisi lintua.		
<b>Harmaafrankoliini</b>	Grey Francolin	( <i>Francolinus pondicerianus</i> )
Yksi ääntelijä Corbettissa, etelässä kuului jokaisen aamun äänimaailmaan.		
<b>Viidakkopensasviiriäinen</b>	Jungle Bush Quail	( <i>Perdicula asiatica</i> )
Kolme lintua Chambalin aamukävelyllä, ja viisi lintua Ranthambhoren kuivalla kivimaalla piikkipensaiden juuressa piilottelemassa.		
<b>Kirjopyyfasaani</b>	Painted Spurfowl	( <i>Galloperdix lunulata</i> )
Yksi lintu Ranthambhoren aamuisella tiikerisafarilla ja pari lintua linnoituksella.		
<b>Punaviidakkokana</b>	Red Junglefowl	( <i>Gallus gallus</i> )
Corbettissa päivittäin muutama lintu.		
<b>Riikinkukko</b>	Indian Peafowl	( <i>Pavo cristatus</i> )
Pohjoisessa harvalukuisempi, etelässä yleinen.		
<b>Intianviheltäjäsorsa</b>	Lesser Whistling-Duck	( <i>Dendrocygna javanica</i> )
Chambaljoella ja pienellä lutakolla majoituksen vieressä runsas. Bharatpurissa jokusia.		
<b>Tiibetinhani</b>	Bar-headed Goose	( <i>Anser indicus</i> )
Chambalilla runsas, Bharatpurissa ja Ranthambhoressa muutama kymmen.		
<b>Ruostesorsa</b>	Ruddy Shelduck	( <i>Tadorna ferruginea</i> )
Ramnagarin padolla 350 lintua. Etelässä runsas kaikkialla missä on vettä.		
<b>Kyhmysorsa</b>	Comb Duck	( <i>Sarkidiornis melanotos</i> )
Chambalilla ja Bharatpurissa päivittäin muutamia lintuja.		

---

<b>Aasiankääpiösorsa</b>	Cotton Pygmy-goose	( <i>Nettapus coromandelianus</i> )
Vain Bund Bharetan järvellä, noin 50 lintua.		
<b>Harmaasorsa</b>	Gadwall	( <i>Anas strepera</i> )
Chambalilla ja Bharatpurissa jokusia, Bund Bharetan järvellä 100 lintua.		
<b>Haapana</b>	Eurasian Wigeon	( <i>Anas penelope</i> )
Etelän vesialueilla paikoittainen.		
<b>Sinisorsa</b>	Mallard	( <i>Anas platyrhynchos</i> )
Bund Bharetan järvellä kaksi lintua.		
<b>Täplänokkasorsa</b>	Spot-billed Duck	( <i>Anas poecilorhyncha</i> )
Chambalilla muutama lintu. Bharatpurissa ja Bund Bharetassa kymmeniä.		
<b>Lapasorsa</b>	Northern Shoveler	( <i>Anas clypeata</i> )
Etelässä suht yleinen. Bund Bharetalla 120.		
<b>Jouhisorsa</b>	Northern Pintail	( <i>Anas acuta</i> )
Etelässä, hieman lapasorsaa harvalukuisempi.		
<b>Tavi</b>	Common Teal	( <i>Anas crecca</i> )
Corbettissa 10, Chambalilla muutama ja Bharatpurissa jokunen kymmenen.		
<b>Punapäänarsku</b>	Red-crested Pochard	( <i>Netta rufina</i> )
Chambalilla 7 lintua ja Bund Bharetalla 20 lintua.		
<b>Punasotka</b>	Common Pochard	( <i>Aythya ferina</i> )
Bund Bharetalla 100 lintua.		
<b>Ruskosotka</b>	Ferruginous Duck	( <i>Aythya nyroca</i> )
Bund Bharetalla 20 lintua.		
<b>Tukkasotka</b>	Tufted Duck	( <i>Aythya fuligula</i> )
Bund Bharetalla 100 lintua.		
<b>Isokoskelo</b>	Goosander	( <i>Mergus merganser</i> )
Yksi ohi lentävä lintu The Denin parvekkeelta Kumeriassa.		
<b>Käenpiika</b>	Eurasian Wryneck	( <i>Jynx torquilla</i> )
Corbettissa ja Chambalilla yksi lintu, Bharatpurissa kaksi lintua.		
<b>Aasianpikkutikka</b>	Grey-capped Woodpecker	( <i>Dendrocopus canicapillus</i> )
Melko yleinen pohjoisessa.		
<b>Liekiniskatikka</b>	Brown-fronted Woodpecker	( <i>Dendrocopus auriceps</i> )
Yhteensä kolme lintua Nainitalissa.		
<b>Aasiankirjotikka</b>	Fulvous-breasted Woodpecker	( <i>Dendrocopus macei</i> )
Muutama lintu Corbettissa ja Nainitalissa.		

<b>Helmiselkätikka</b> Pari lintua Ranthambhoreessa.	Yellow-crowned Woodpecker	( <i>Dendrocopus mahrattensis</i> )
<b>Ruskokirjotikka</b> Kolme lintua Nainitalin ja Pangotin välillä.	Rufous-bellied Woodpecker	( <i>Hypopicus hyperythrus</i> )
<b>Kultaniskatikka</b> Kumeriassa ja Corbettissa päivittäin muutama lintu.	Lesser Yellownappe	( <i>Picus chlorolophus</i> )
<b>Liekkivihertikka</b> Kumeriassa ja Corbettissa päivittäin muutama lintu.	Greater Yellownappe	( <i>Picus flavinucha</i> )
<b>Harmaapäätikka</b> Kumeriassa, Corbettissa ja Nainitalissa päivittäin muutama lintu. Eri näköinen kuin meillä.	Grey-headed Woodpecker	( <i>Picus canus</i> )
<b>Isotulitöyhtö</b> Corbettissa kolme lintua.	Himalayan Flameback	( <i>Dinopium shorii</i> )
<b>Intiantulitöyhtö</b> Yleisin Corbettissa, muuten muutama lintu siellä täällä koko matkalla.	Black-rumped Flameback	( <i>Dinopium benghalense</i> )
<b>Isohelmitikka</b> Kolme komeaa ja hienosti ääntelevää lintua Corbettissa.	Great Slaty Woodpecker	( <i>Mulleripicus pulverulentus</i> )
<b>Kuningasseppä</b> Nainitalissa ja Pangotissa, yksi nähty ja muutama ääntelevä lintu.	Great Barbet	( <i>Megalaima virens</i> )
<b>Rusohuppuseppä</b> Etelässä muutamia.	Brown-headed Barbet	( <i>Megalaima zeylanica</i> )
<b>Marmoriseppä</b> Pohjoisessa muutamia.	Lineated Barbet	( <i>Megalaima lineata</i> )
<b>Turkoosiseppä</b> Corbettissa kaksi lintua.	Blue-throated Barbet	( <i>Megalaima asiatica</i> )
<b>Kilkkuseppä</b> Muutama havainto koko reissun ajalta.	Coppersmith Barbet	( <i>Megalaima haemacephala</i> )
<b>Intiantoko</b> Muutama lintu Delhissä, Chambalilla ja Bharatpurissa.	Indian Grey Hornbill	( <i>Ocyrceros birostris</i> )
<b>Harjalintu</b> Pohjoisessa muutamia, etelässä yleinen.	Eurasian Hoopoe	( <i>Upupa epops</i> )
<b>Intiansininärhi</b> Yleinen ja melko runsas etelässä ja Delhin seudulla.	Indian Roller	( <i>Coracias benghalensis</i> )
<b>Kuningaskalastaja</b> Muutamia siellä täällä koko reissun aikana.	Common Kingfisher	( <i>Alcedo atthis</i> )

<b>Sulttaanikalastaja</b> Yksi hieno lintu Corbettissa.	Stork-billed Kingfisher	( <i>Pelargopsis capensis</i> )
<b>Aasiankalastaja</b> Yleinen ja melko runsas kaikkialla, missä edes pieni rapakko. Pohjoisessa hieman harvemmin tavattu.	White-throated Kingfisher	( <i>Halcyon smyrnensis</i> )
<b>Aasiankeisarikalastaja</b> Kumeria, Corbett ja Kosi River yhteensä neljä lintua.	Crested Kingfisher	( <i>Megaceryle guttulata</i> )
<b>Kirjokalastaja</b> Siellä täällä muutamia lintuja koko matkan varrella. Toiseksi yleisin kalastaja.	Pied Kingfisher	( <i>Ceryle rudis</i> )
<b>Siniampiaissyöjä</b> Yksi lintu Corbettin aamuretkeillä Dhikalan pihassa.	Blue-bearded Bee-eater	( <i>Nyctyornis athertoni</i> )
<b>Pikkumehiläissyöjä</b> Ranthambhoressa Soorwalin padon lähetyvillä 50 lintua.	Green Bee-eater	( <i>Merops orientalis</i> )
<b>Aasiankukaali</b> Muutama lintu siellä täällä koko matkan ajan. Etelässä yleisempi.	Greater Coucal	( <i>Centropus sinensis</i> )
<b>Isokauluskaija</b> Viisi lintua Ranthambhoren tiikerisafareilla ja linnoituksella.	Alexandrine Parakeet	( <i>Psittacula eupatria</i> )
<b>Kauluskaija</b> Etelässä yleinen ja runsas kaikkialla, hallitsee äänimaailmaa.	Rose-ringed Parakeet	( <i>Psittacula krameri</i> )
<b>Himalajankaija</b> Corbettissa ja Nainitalissa muutamia. Sat Talin alueella sadan linnun parvi.	Slaty-headed Parakeet	( <i>Psittacula himalayana</i> )
<b>Luumupääkaija</b> Corbettissa ja Chambalilla muutama lintu, Ranthambhoressa runsas.	Plum-headed Parakeet	( <i>Psittacula cyanocephala</i> )
<b>Punarintakaija</b> Corbettissa kymmeniä päivässä.	Red-breasted Parakeet	( <i>Psittacula alexandri</i> )
<b>Haukkakäki</b> Yksi yli lentävä lintu Chambalin jokiristeilyllä.	Common Hawk-Cuckoo	( <i>Cuculus varius</i> )
<b>Himalajansalangaani</b> Kumerian alueella yhteensä parikymmentä lintua.	Himalayan Swiftlet	( <i>Aerodramus brevirostris</i> )
<b>Metsäkiitäjä</b> Kumeria, Kosi River ja Corbett kymmenittäin.	White-rumped Needletail	( <i>Zoonavena sylvatica</i> )
<b>Alppikiitäjä</b> Nainitalin rinteillä parikymmentä lintua.	Alpine Swift	( <i>Tachymarptis melba</i> )
<b>Pikkukiitäjä</b> Pohjoisessa Kosi Riverillä muutamia, etelässä yleinen ja Ranthambhoressa runsas.	House Swift	( <i>Apus affinis</i> )

<b>Intiantöyhtökiitäjä</b> Pohjoisessa yleinen ja paikoitellen runsas.	Crested Tree-Swift	( <i>Hemiprocne coronata</i> )
<b>Sepelpöllönen</b> Chambalilla ja Bharatpurissa yhteensä kolme lintua. Muiden pöllöjen tapaan paikat pitää olla tiedossa eli paikallisopas tarvitaan	Collared Scops-Owl	( <i>Otus lettia</i> )
<b>Harmaahuuhkaja</b> Yksi pesällään hautova naaraslintu Bharatpurissa.	Dusky Eagle-Owl	( <i>Bubo coromandus</i> )
<b>Kalahuuhkaja</b> Yhteensä kolme lintua: Kumeria, Corbett ja Chambal.	Brown Fish-Owl	( <i>Ketupa zeylonensis</i> )
<b>Vuorikalahuuhkaja</b> Yksi lintu Corbettissa matkalla Dhikalaan.	Tawny Fish-Owl	( <i>Ketupa flavipes</i> )
<b>Kaulusvarpuspöllö</b> Kaksi aktiivisesti atrappiin vastannutta lintua Nainitalin ja Pangotin välillä.	Collared Owlet	( <i>Glaucidium brodiei</i> )
<b>Raitavarpuspöllö</b> Kaksi lintua Corbettissa.	Asian Barred Owlet	( <i>Glaucidium cuculoides</i> )
<b>Intianvarpuspöllö</b> Yksi lintu Corbettissa.	Jungle Owlet	( <i>Glaucidium radiatum</i> )
<b>Brahmanpöllö</b> Yleinen Chambalilla, Bharatpurissa ja Ranthambhoressa. Paras päivä Bharatpurissa 15 lintua.	Spotted Owlet	( <i>Athene brama</i> )
<b>Haukkapöllö</b> Chambal River Lodgen pihapiirissä päivehtivä lintu joka päivä.	Brown Hawk-Owl	( <i>Ninox scutulata</i> )
<b>Pitkäpyrstökehrääjä</b> Yksi auringossa puun oksalla lepäilevä lintu Bharatpurissa. Näidenkin kanssa oppaan tietotaito korvaamaton.	Large-tailed Nightjar	( <i>Caprimulgus macrurus</i> )
<b>Harmaakehrääjä</b> Yksi lintu Bharatpurissa, samoilta jalansijoilta pitkäpyrstökehrääjän kanssa.	Grey Nightjar	( <i>Caprimulgus indicus</i> )
<b>Kalliokyyhky</b> Hyvin yleinen ja runsas kaikkialla.	Rock Dove	( <i>Columba livia</i> )
<b>Idänturturikyyhky</b> Corbettissa ja Nainitalissa pari lintua. Pangotin rinteillä parinkymmenen linnun parvi.	Oriental Turtle Dove	( <i>Streptopelia orientalis</i> )
<b>Palmukyyhky</b> Pohjoisessa muutama, etelässä yleinen ja melko runsas kaikkialla.	Laughing Dove	( <i>Streptopelia senegalensis</i> )
<b>Aasian turturikyyhky</b> Muutama kymmenen lintua Corbettissa.	Spotted Dove	( <i>Streptopelia chinensis</i> )

<b>Pikkuturturikyyhky</b>	Red Collared-Dove	( <i>Streptopelia tranquebarica</i> )
Etelässä päivittäin 5-20 lintua turkinkyyhkyjen joukossa.		
<b>Turkinkyyhky</b>	Eurasian Collared-Dove	( <i>Streptopelia decaocto</i> )
Etelässä yleinen ja runsas.		
<b>Smaragdikyyhky</b>	Emerald Dove	( <i>Chalcophaps indica</i> )
Kumeriassa Mohanin temppelin luona yksi lintu ja Nainitalin alarinteillä Sat Talissa kaksi lintua.		
<b>Huiluviherkyyhky</b>	Yellow-footed Green Pigeon	( <i>Treron phoenicoptera</i> )
Etelässä muutamia lintuja siellä täällä.		
<b>Puikkopyrstökyyhky</b>	Pin-tailed Green-Pigeon	( <i>Treron apicauda</i> )
Yksi "sumukököttäjä" Corbettissa Dhikalan pihassa aamuretkellä.		
<b>Saruskurki</b>	Sarus Crane	( <i>Grus antigone</i> )
Yksi reissun haetuimmista linnuista. Bharatpurissa kaksi lintua tuli yöpymään oppaan tietämälle tasangolle. Bund Bharetan padolta tultaessa kaksi spondea lintua sinappipellolla tien varressa, jotka antoivat komean lentonäytöksen.		
<b>Ruskosuokana</b>	Brown Crake	( <i>Amaurionis akool</i> )
Yksi lintu Corbettissa Ramngangajoella ja yksi lintu Chambalin risteilyllä.		
<b>Ojasuokana</b>	White-breasted Waterhen	( <i>Amaurionis phoenicurus</i> )
Chambalilla ja Ranthambhoreassa muutamia, Bharatpurissa yleinen.		
<b>Sulttaanikana</b>	Purple Swampfen	( <i>Porphyrio porphyrio</i> )
Kymmenkunta lintua tienvarren lutakoissa Delhin ja Agran välillä ja 20 lintua Bund Bharetan järvellä.		
<b>Liejukana</b>	Common Moorhen	( <i>Gallinula chloropus</i> )
Etelässä siellä täällä muutamia.		
<b>Nokikana</b>	Eurasian Coot	( <i>Fulica atra</i> )
Kymmenen lintua Nainitalin järvellä. Etelässä muutama lintu siellä täällä ja Bund Bharetan järvellä tuhansia.		
<b>Intianhietakyyhky</b>	Painted Sandgrouse	( <i>Pterocles indicus</i> )
Bund Bharetan kukkuloilla kaksi lintua ja Ranthambhoren linnoituksella neljä lintua. Ranthambhoren majaan, The Tiger Denin takaiselle lutakolle saapui iltaisin kuuden jälkeen juomaan noin 30 lintua.		
<b>Taivaanvuohi</b>	Common Snipe	( <i>Gallinago gallinago</i> )
Muutamia lintuja Bharatpurissa ja Ranthambhoreassa.		
<b>Mustapyrstökuiri</b>	Black-tailed Godwit	( <i>Limosa limosa</i> )
Bund Bharetan järvellä 60 lintua ja Ranthambhoreassa 10 lintua.		
<b>Mustaviklo</b>	Spotted Redshank	( <i>Tringa erythropus</i> )
Chambalilla ja Bharatpurissa muutamia.		
<b>Punajalkaviklo</b>	Common Redshank	( <i>Tringa totanus</i> )
Chambalilla ja Bharatpurissa kymmenkunta lintua päivittäin.		

<b>Lampiviklo</b>	Marsh Sandpiper	( <i>Tringa stagnatilis</i> )
Bharatpurissa ja Ranthamboressa päivittäin 2-10 lintua.		
<b>Valkoviklo</b>	Common Greenshank	( <i>Tringa nebularia</i> )
Pohjoisessa muutamia, etelässä yleinen, 5-30 lintua päivässä.		
<b>Metsäviklo</b>	Green Sandpiper	( <i>Tringa ochropus</i> )
Pohjoisessa muutama. Etelässä yleinen, 1-20 lintua päivässä.		
<b>Liro</b>	Wood Sandpiper	( <i>Tringa glareola</i> )
Etelässä yleinen, Bharatpurissa 50 lintua päivässä.		
<b>Rantasipi</b>	Common Sandpiper	( <i>Tringa hypoleucos</i> )
Pohjoisessa muutamia. Etelässä vajaa parikymmentä päivässä.		
<b>Lapinsirri</b>	Temminck's Stint	( <i>Calidris temminckii</i> )
Chambalin jokiristeilyllä 100 lintua ja Bharatpurissa kymmenittäin.		
<b>Pikkusirri</b>	Little Stint	( <i>Calidris minuta</i> )
Yksi lintu Chambalilla, majoituksen viereisellä lutakolla.		
<b>Suokukko</b>	Ruff	( <i>Philomachus pugnax</i> )
Etelässä muutama lintu siellä täällä.		
<b>Kultakurppo</b>	Greater Painted-snipe	( <i>Rostratula benghalensis</i> )
Bharatpurin paikallisoppaan tietopaikassa, paikallisessa jätevesiojassa kaikkiaan 11 lintua. Selvästi paikan ennätys, koska aiemmin ollut vain 1-3 lintua.		
<b>Pronssijassana</b>	Bronze-winged Jacana	( <i>Metopidius indicus</i> )
Bund Bharetan järvellä noin 30 lintua.		
<b>Pitkäpyrstöjassana</b>	Pheasant-tailed Jacana	( <i>Hydrophasianus chirurgus</i> )
Bund Bharetan järvellä noin 30 lintua.		
<b>Paksujalka</b>	Eurasian Thick-knee	( <i>Burhinus oediconemus</i> )
Pari lintua Bharatpurin kuivalla "pensasaavikolla".		
<b>Intianpaksujalka</b>	Great Thick-knee	( <i>Burhinus recurvirostris</i> )
Corbettissa Ramngangajoen suistossa kolme lintua ja Chambalin jokiristeilyllä kaksi lintua.		
<b>Pitkäjalka</b>	Black-winged Stilt	( <i>Himantopus himantopus</i> )
Etelämpänä hyvin yleinen ja paikoin runsas.		
<b>Avosetti</b>	Pied Avocet	( <i>Recurvirostra avosetta</i> )
Muutamia lintuja etelän lutakoilla.		
<b>Pikkutylli</b>	Little Ringed Plover	( <i>Charadrius dubius</i> )
Muutama lintu Corbettissa ja Ranthamboressa, 10 Chambalin jokiristeilyllä.		
<b>Mustajalkatylli</b>	Kentish Plover	( <i>Charadrius alexandrinus</i> )
Chambalin rannoilla 5 lintua.		

---

<b>Intianhyökkä</b> Chambalilla 10 lintua ja Ranthambhoressa 5 lintua.	Yellow-wattled Lapwing	( <i>Vanellus malabaricus</i> )
<b>Jokihyökkä</b> Pohjoisen jokivarsilla ja Chambalilla muutamia kymmeniä.	River Lapwing	( <i>Vanellus duvaucelii</i> )
<b>Kenttähyökkä</b> Yleinen kaikkialla muualla paitsi Nainitalissa.	Red-wattled Lapwing	( <i>Vanellus indicus</i> )
<b>Suohyökkä</b> Bharatpurin kosteikoilla 5 lintua.	White-tailed Lapwing	( <i>Vanellus leucurus</i> )
<b>Intianaavikkojuoksija</b> Bharatpurin kuivuneilla kosteikoilla, heinäaroilla, kaikkiaan 8 lintua. Myös reissun tähtilajeja.	Indian Courser	( <i>Cursorius coromandelicus</i> )
<b>Intiansaksinokka</b> Chambalin jokiristeilyn tähtilaji, havaittiin 18 linnun parvi.	Indian Skimmer	( <i>Rynchops albicollis</i> )
<b>Aroharmalokki</b> Yksi lintu Taj Mahalin takaisella joella.	Yellow-legged Gull	( <i>Larus cachinnans</i> )
<b>Mustapäälokki</b> Chambalilla yhteensä parikymmentä yli lentävää lintua.	Pallas's Gull	( <i>Larus ichthyaetus</i> )
<b>Hietatiira</b> Bund Bharetan järvellä kaikkiaan puolenkymmentä lintua.	Gull-billed Tern	( <i>Gelochelidon nilotica</i> )
<b>Jokitiira</b> Corbettissa, Chambalilla, Bharatpurissa ja Ranthambhoressa enintään 15 lintua jokaisella paikalla.	River Tern	( <i>Sterna aurantia</i> )
<b>Mustavatsatiira</b> Chambalin jokiristeilyllä kaikkiaan 7 lintua.	Black-bellied Tern	( <i>Sterna acuticauda</i> )
<b>Sääksi</b> Corbettissa 3 lintua ja Chambalilla 2 lintua.	Osprey	( <i>Pandion haliaetus</i> )
<b>Idänmehiläishaukka</b> Etelässä siellä täällä. Chambalin majoituksen pihapiirissä 10 lintua.	Oriental Honey Buzzard	( <i>Pernis ptilorhyncus</i> )
<b>Liitohaukka</b> Yleinen ja paikoin runsas kaikkialla paitsi Nainitalissa.	Black-shouldered Kite	( <i>Elanus caeruleus</i> )
<b>Haarahaukka</b> Hyvin yleinen ja kaikkialla kaupunkien lähetyillä hyvin runsas, jopa lähes sadan linnun parvia.	Black Kite	( <i>Milvus migrans</i> )
<b>Aromerikotka</b> Kaikkiaan neljä havaintoa Corbettissa, joista yksi lintu pesällä.	Pallas's Fish-Eagle	( <i>Haliaeetus leucoryphus</i> )
<b>Pikkukalakotka</b> Corbettissa yhteensä kymmenkunta lintua.	Lesser Fish-Eagle	( <i>Ichthyophaga humilis</i> )

<b>Partakorppikotka</b>	Lammergeier	( <i>Gypaetus barbatus</i> )
Nainitalissa Pangotin ja Sat Talin retkillä yhteensä 5 vanhaa lintua. Reissun odotetuimpia lajeja.		
<b>Pikkukorppikotka</b>	Egyptian Vulture	( <i>Neophron percnopterus</i> )
Kumeriassa kolme lintua. Delhin, Agran, Chambalin ja Bharatpurin alueilla yleinen ja paikoin runsas.		
<b>Bengalinkorppikotka</b>	White-rumped Vulture	( <i>Gyps bengalensis</i> )
Yksi yli lentänyt lintu Ramnagarin padolla.		
<b>Intiankorppikotka</b>	Long-billed Vulture	( <i>Gyps indicus</i> )
Ranthambhoreessa 10 lintua päivittäin.		
<b>Himalajankorppikotka</b>	Himalayan Griffon Vulture	( <i>Gyps himalayensis</i> )
Nainitalissa ja Pangotin seuduilla yhteensä neljä lintua.		
<b>Hanhikorppikotka</b>	Eurasian Griffon Vulture	( <i>Gyps fulvus</i> )
Pohjoisessa selvästi yleisin korppikotka, päivittäin 5-35 lintua. Pangotin rinteillä 25 linnun parvi.		
<b>Munkkikorppikotka</b>	Black (Cinereous) Vulture	( <i>Aegypius monachus</i> )
Kumerian ja Corbettin alueella yhteensä kymmenen lintua.		
<b>Kalmokorppikotka</b>	Red-headed Vulture	( <i>Sarcogyps calvus</i> )
Kumeriassa ja Corbettissa muutamia lintuja päivittäin. Ranthambhoreessa yksi lintu.		
<b>Harjakotka</b>	Crested Serpent Eagle	( <i>Spilornis cheela</i> )
Muutama lintu siellä täällä koko reissun matkalla.		
<b>Ruskosuohaukka</b>	Eurasian Marsh Harrier	( <i>Circus aeruginosus</i> )
Pari lintua Bharatpurin kosteikoilla.		
<b>Huppusuohaukka</b>	Pied Harrier	( <i>Circus melanoleucos</i> )
Yksi nuori lintu Corbettissa Dhikalan pihalta.		
<b>Sinisuohaukka</b>	Northern Harrier	( <i>Circus cyaneus</i> )
Corbettissa yhteensä 10 lintua.		
<b>Arovarpushaukka</b>	Shikra	( <i>Accipiter badius</i> )
Muutamia lintuja siellä täällä koko reissun matkalla.		
<b>Ruostevarpushaukka</b>	Besra	( <i>Accipiter virgatus</i> )
Yksi lintu Nainitalin Snow View Pointilla.		
<b>Hiirihaukka</b>	Common Buzzard	( <i>Buteo buteo</i> )
Yhteensä kaksi lintua Bharatpurissa.		
<b>Arohiirihaukka</b>	Long-legged Buzzard	( <i>Buteo rufinus</i> )
Nainitalissa ja Bharatpurissa yksi lintu, Chambalilla vähintään 5 lintua.		
<b>Valkosilmähaukka</b>	White-eyed Buzzard	( <i>Butastur teesa</i> )
Yksi lintu Bharatpurissa.		

- Rosvokotka** Black Eagle (*Ictinaetus malayensis*)  
Reissun mukavimpia yllätyksiä. Yksi hieno aikuinen lintu lipui Bund Bharetan järven vieritse meidän ja britti-ryhmän iloksi.
- Kiljukotka** Greater Spotted Eagle (*Aquila clanga*)  
Chambalilla ja Bharatpurissa muutamia lintuja
- Arokotka** Steppe Eagle (*Aquila nipalensis*)  
Yksi lintu Kumeriassa ja viisi lintua Bharatpurissa, Nainitalin ja Pangotin seuduilla yleinen. Nainitalin alarinteillä, kaatopaikan liepeillä, oli kaikkiaan noin 50 lintua.
- Keisarikotka** Eastern Imperial Eagle (*Aquila heliaca*)  
Yksi nuori ja yksi vanha lintu Bharatpurissa.
- Vuorikotka** Bonelli's Eagle (*Hieraaetus fasciatus*)  
Nainitalissa Pangotin reissulla kaksi lintua, Chambalin jokiristeilyllä kaksi lintua ja Ranthambhoressa kaksi lintua.
- Pikkukotka** Booted Eagle (*Hieraaetus pennatus*)  
Yksi tumman muodon lintu Bund Bharetan järvellä samoissa nosteissa rosvokotkan kanssa.
- Punavatsakotka** Rufous-bellied Eagle (*Hieraaetus kienerii*)  
Yksi vanha lintu Corbettin lähtöpäivänä.
- Jalokotka** Changeable Hawk-Eagle (*Spizaetus cirrhatus*)  
Kumerian ja Corbettin seuduilla muutama lintu.
- Mahtijalokotka** Mountain Hawk-Eagle (*Spizaetus nipalensis*)  
Corbettissa viisi lintua ja Nainitalissa pari lintua. Muistuttaa suurta kanahaukkaa ja kaarrellessa siivet tunnusomaisesti todella syvässä v-asennossa.
- Himalajanhaukkanen** Collared Falconet (*Microhierax caerulescens*)  
Corbettissa yksi lintu molempina päivinä. Hämmäntävän kokoinen lintu esimerkiksi intiantöyhtökiitäjäparven keskellä.
- Tuulihaukka** Eurasian Kestrel (*Falco tinnunculus*)  
Muutamia lintuja koko matkan varrella.
- Palmuhaukka** Red-necked Falcon (*Falco chicquera*)  
Yksi yli lentänyt lintu Chambalin jokiristeilyllä.
- Idännuolihaukka** Oriental Hobby (*Falco severus*)  
Yksi yli lentänyt lintu Corbettin menopäivänä.
- Muuttohaukka** Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*)  
Kaksi lintua Corbettissa Dhikalan viereisestä näkötorresta havaittuna.
- Pikku-Uikku** Little Grebe (*Tachybaptus ruficollis*)  
Etelässä muutamia lintuja siellä täällä joilla ja järvillä.

- Silkkiuikku** Great Crested Grebe (*Podiceps cristatus*)  
Ramnagarin padolla pari lintua ja kymmenkunta lintua Bund Bharetan järvellä.
- Käärmekaula** Oriental Darter (*Anhingha melanogaster*)  
Bund Bharetan järvellä ja Bharatpurin keskustan läheisellä joella muutamia. Ranthambhoren linnoituksen alapuolisella järvellä viisi lintua.
- Jaavanmerimetso** Little Cormorant (*Phalacrocorax niger*)  
Yleisin merimetsolaji. Siellä täällä vesien äärellä muutamia tai muutamia kymmeniä.
- Merimetso** Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo*)  
Runsain merimetsolaji. Siellä täällä vesien äärellä, Corbettissa Ramngangajoella ja Bund Bharetan järvellä useita satoja.
- Silkkihaikara** Little Egret (*Egretta garzetta*)  
Paikoitellen koko reissun matkalla, etelässä eniten, mutta ei missään erityisen runsas.
- Harmaahaikara** Grey Heron (*Ardea cinerea*)  
Etelässä yleinen ja varsinkin Chambalin jokiristeilyllä hyvin runsaslukuinen.
- Ruskohaikara** Purple Heron (*Ardea purpurea*)  
Kaikkiaan kolme lintua Bund Bharetan järvellä.
- Jalohaikara** Great Egret (*Egretta alba*)  
Melko yleinen koko reissun matkalla, selvästi eniten Bharatpurissa ja Bund Bharetan järvellä.
- Pikkujalohaikara** Intermediate Egret (*Ardea intermedia*)  
Muutama lintu Kosi Riverillä, Chambalilla ja Bharatpurissa.
- Lehmähaikara** Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)  
Hyvin yleinen ja runsas kaikkialla paitsi Nainitalissa. Pelloilla, pienimmissä lampareissa, likaojissa ja ihmisten seuralaisena asumusten pihossa.
- Intianriisahaikara** Indian Pond Heron (*Ardeola grayii*)  
Muutamia lintuja siellä täällä koko reissun matkalla.
- Kyyryhaikara** Striated Heron (*Butorides striatus*)  
Yksi lintu Ramnagarin padolla.
- Kanelipikkuhaikara** Cinnamon Bittern (*Ixobrychus cinnamomeus*)  
Yksi lintu lennossa autosta Bund Bharetan järvelle mennessä.
- Pronssi-libis** Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*)  
Bund Bharetan järvellä kaikkiaan noin 15 lintua.
- Aasianpyhälibis** Black-headed Ibis (*Threskiornis melanocephalus*)  
Bharatpurin kosteikoilla, Bund Bharetan järvellä ja Ranthambhoreissa yhteensä 15 lintua.
- Intianiibis** Black Ibis (*Pseudibis papillosa*)  
Chambalin jokiristeilyllä yhteensä kolme lintua.

- Kapustahaikara** Eurasian Spoonbill (*Platalea leucorodia*)  
Chambalilla ja Bharatpurissa muutama kymmenen lintua.
- Pelikaani** Great White Pelican (*Pelecanus onocrotalus*)  
Pari autosta havaittua lintua Chambalin ja Bharatpurin välillä ja viisi lintua Ranthambhoren majoituksen pihasta.
- Kiharapelikaani** Dalmatian Pelican (*Pelecanus crispus*)  
Bharatpurissa pyöräriksan kyydistä havaittiin neljän linnun parvi.
- Aasianiibishaikara** Painted Stork (*Mycteria leucocephala*)  
Bharatpurin viereisellä joella ja Taj Mahalilla kymmeniä lintuja, Ranthambhoren linnoituksen alapuolisella järvellä yhteensä parikymmentä lintua.
- Aasianrakonokka** Asian Open-billed Stork (*Anastomus oscitans*)  
Chambalissa ja Bharatpurissa muutamia lintuja päivittäin.
- Mustahaikara** Black Stork (*Cinconia nigra*)  
Kymmenisen lintua Corbettin tasangolla Dhikalan pihasta havaittuna.
- Piispahaikara** Woolly-necked Stork (*Ciconia episcopus*)  
Viisi lintua Corbettissa ja pari hienosti yli lentänyttä lintua Kosi Riverillä.
- Aasiansatulahaikara** Black-necked Stork (*Ephippiorhynchus asiaticus*)  
Yksi lintu Corbettissa Ramngangajoen rannalla, yksi lintu Delhin ja Chambalin välillä autosta havaittuna ja kaksi lintua Bharatpurin kosteikoilla.
- Punapyrstölepinkäinen** Isabelline Shrike (*Lanius isabellinus*)  
Yhteensä neljä lintua Delhin lähellä tien varressa, Chambalilla ja Bharatpurissa.
- Intianpikkulepinkäinen** Bay-backed Shrike (*Lanius vittatus*)  
Kaikkiaan kolme lintua etelässä.
- Ruskoperälepinkäinen** Long-tailed Shrike (*Lanius schach*)  
Selvästi yleisin lepinkäinen. Yleinen koko matkan varrella, 1-20 lintua päivässä.
- Tiibetinlepinkäinen** Grey-backed Shrike (*Lanius tephronotus*)  
Yksi lintu Nainitalissa Pangotin reissulla.
- Etelänisolepinkäinen** Southern Grey Shrike (*Lanius meridionalis*)  
Muutamia lintuja etelässä, pohjoisessa Kosi Riverillä ja autosta Delhin lähistöllä.
- Närhi** Eurasian Jay (*Garrulus glandarius*)  
Nainitalissa Sat Talin alueella kymmenen linnun parvi himalajannärhien mukana.
- Himalajannärhi** Black-headed Jay (*Garrulus lanceolatus*)  
Nainitalissa Pangotin reissulla muutama ja Sat Talissa yhteensä 30 lintua.
- Loistoharakka** Red-billed Blue Magpie (*Urocissa erythrorhyncha*)  
Kumeriassa The Denin pihassa kolme lintua ja Nainitalissa Pangotin seudulla 10 lintua.

<b>Vierharakka</b>	Common Green Magpie	( <i>Cissa chinensis</i> )
Corbettissa yksi lintu. Reissun ehdottomasti hienoimpia lintuja.		
<b>Huppuviidakkoarakka</b>	Rufous Treepie	( <i>Dendrocitta vagabunda</i> )
Corbettissa muutamia, etelässä yleisempi ja Ranthambhoreassa melko runsas.		
<b>Naamioviidakkoarakka</b>	Grey Treepie	( <i>Dendrocitta formosae</i> )
Nainitalissa Pangotin reissulla ja Sat Talissa yhteensä 5 lintua.		
<b>Intianvaris</b>	House Crow	( <i>Corvus splendens</i> )
Delhin seudulla ja etelässä yleinen, mutta ei kovin runsas missään.		
<b>Paksunokkavaris</b>	Large-billed Crow	( <i>Corvus macrorhynchos</i> )
Päivittäin koko matkan varrella, yleinen ja runsas lähes kaikkialla.		
<b>Huppukuhankeittäjä</b>	Black-hooded Oriole	( <i>Oriolus xanthornus</i> )
Corbettissa Dhikalan liepeillä neljä lintua.		
<b>Kastanjakuhankeittäjä</b>	Maroon Oriole	( <i>Oriolus traillii</i> )
Koiras ja naaraslintu eri päivinä Corbettissa.		
<b>Intianisokäpinkäinen</b>	Large Cuckoo-shrike	( <i>Coracina macei</i> )
Yksi lintu pikaisesti Corbettissa.		
<b>Pikkuminivetti</b>	Small Minivet	( <i>Pericrocotus cinnamomeus</i> )
Chambalilla ja Bharatpurissa pari lintua, Ranthambhoreassa pari pientä parvea.		
<b>Liekkiminivetti</b>	Long-tailed Minivet	( <i>Pericrocotus ethologus</i> )
Corbettissa muutama kymmenen lintua.		
<b>Pilkkaminivetti</b>	Scarlet Minivet	( <i>Pericrocotus flammeus</i> )
Kumerian ja Corbettin seuduilla yhteensä parikymmentä.		
<b>Sieppokäpinkäinen</b>	Bar-winged Flycatcher-shrike	( <i>Hemipus picatus</i> )
Kumerian ja Corbettin metsissä yleinen.		
<b>Keltavatsamonarkki</b>	Yellow-bellied Fantail	( <i>Rhipidura hypoxantha</i> )
Kumerian ja Corbettin seuduilla päivittäin kymmenkunta lintua. Uusi nimiehdotus "aamupyrstönlevittäjä" tai "iltapihistäjä".		
<b>Harmaavatsamonarkki</b>	White-throated Fantail	( <i>Rhipidura albicollis</i> )
Pohjoisessa päivittäin noin kymmenen lintua.		
<b>Valko-otsamonarkki</b>	White-browed Fantail	( <i>Rhipidura aureola</i> )
Ranthambhoreassa kaksi lintua.		
<b>Mustadrongo</b>	Black Drongo	( <i>Dicrurus macrocercus</i> )
Yleinen ja runsas koko matkan varrella, jopa parikymmenen linnun parvia.		
<b>Valkovatsadrongo</b>	White-bellied Drongo	( <i>Dicrurus caerulescens</i> )
Ranthambhoreassa kahtena päivänä yhteensä 15 lintua.		

<b>Pronssidrongo</b>	Bronzed Drongo	( <i>Dicrurus aeneus</i> )
Kumerian ja Nainitalin seuduilla yhteensä reilu 30 lintua.		
<b>Pikkuviiridrongo</b>	Lesser Racket-tailed Drongo	( <i>Dicrurus remifer</i> )
Corbetissa kahtena päivänä. Komeat, erikoistuneet pyrstösulat.		
<b>Jora</b>	Common Iora	( <i>Aegithina tiphia</i> )
Corbetissa yhteensä parikymmentä lintua, Ranthambhoressa pari havaintoa.		
<b>Metsäkäpinkäinen</b>	Common Wood-Shrike	( <i>Tephrodornis pondicerianus</i> )
Alle kymmenen lintua koko matkan varrella.		
<b>Isokivikorastas</b>	Chestnut-bellied Rock-Thrush	( <i>Monticola rufiventris</i> )
Nainitalissa Pangotin ja Sat Talin alueilla yhteensä 7 lintua. Kirjan karttojen mukaan alueella harvinainen.		
<b>Sinirastas</b>	Blue Rock Thrush	( <i>Monticola solitarius</i> )
Chambalin rannoilla 5 lintua ja Ranthambhoressa pari lintua.		
<b>Sinijokirastas</b>	Blue Whistling-Thrush	( <i>Myophonus caeruleus</i> )
Pohjoisessa hyvin yleinen ja runsas. Näkyvin rastaslintu.		
<b>Himalajankirjorastas</b>	Long-tailed Thrush	( <i>Zoothera dixonii</i> )
Yksi lintu Nainitalin Snow View Pointilla.		
<b>Isonokkarastas</b>	Long-billed Thrush	( <i>Zoothera monticola</i> )
Yksi hieno lintu Kumeriassa Mohanin kappelin kohdilla.		
<b>Harmaasiipirastas</b>	Grey-winged Blackbird	( <i>Turdus boulboul</i> )
Nainitalin Snow View Pointilla yksi naaras ja Sat Talin metsiköissä yhteensä 5 lintua.		
<b>Oranssivyösiippo</b>	Rufous-gorgeted Flycatcher	( <i>Ficedula strophilata</i> )
Kumerian alueella muutamia naaraslintuja ja Nainitalissa Sat Talin metsiköissä pari hienoa koiraslintua.		
<b>Pikkusieppo</b>	Red-breasted Flycatcher	( <i>Ficedula parva</i> )
Kumerian ja Corbettin alueella yhteensä kolme lintua. Chambalilla ja Bharatpurissa 5-15 lintua päivässä.		
<b>Idänpikkusieppo</b>	Taiga Flycatcher	( <i>Ficedula albicilla</i> )
Corbettissa yleisempi kuin tavan pikkusieppo, yhteensä 13 havaintoa.		
<b>Sinipikkusieppo</b>	Slaty-blue Flycatcher	( <i>Ficedula tricolor</i> )
Kumeriassa ja Nainitalissa yhteensä neljä lintua.		
<b>Pikkusinisieppo</b>	Small Niltava	( <i>Niltava macgrigoriae</i> )
Komea koiraslintu Nainitalissa Pangotin rinteillä.		
<b>Hopealakkisieppo</b>	Rufous-bellied Niltava	( <i>Niltava sundara</i> )
Kumerian alueella vajaa kymmenen hienonväristä lintua.		
<b>Viitasieppo</b>	Grey-headed Canary-Flycatcher	( <i>Culicicapa ceylonensis</i> )
Kumerian ja Corbettin metsissä yhteensä reilut kymmenen lintua.		

- Puistosinisiippo** Tickell's Blue Flycatcher (*Cyornis tickelliae*)  
Kaksi lintua Ranthambhoren tiikerisafareilla.
- Rubiinisatakieli** Siberian Rubythroat (*Luscinia calliope*)  
Upea koiraslintu Corbettissa Dhikalan pihassa aamuretkellä. Naaraslintu Nainitalin Sat Talin alueella.
- Himalajansatakieli** Himalayan Rubythroat (*Luscinia pectoralis*)  
Komeat koiraslinnut Kumeriassa The Denin lähetyillä ja Corbettissa Dhikalan vieressä.
- Sinirinta** Bluethroat (*Luscinia svecica*)  
Bharatpurissa muutama lintu ja Ranthambhoreissa yksi.
- Himalajanpunarinta** Indian Blue Robin (*Luscinia brunnea*)  
Yksi hieno koiraslintu Kumeriassa Mohanin kappelin liepeillä.
- Kultasinipyrstö** Golden Bush Robin (*Tarsiger chrysaesus*)  
Reissun yksi hienoimpia löytöjä. Hieno koiraslintu Nainitalissa Pangotin rinteillä.
- Sinipyrstö** Red-flanked Bluetail (*Tarsiger cyanurus*)  
Suhteellisen yleinen Nainitalissa, etenkin Sat Talin alueella. Yhteensä havaintoja ainakin 15 linnusta.
- Harakkatasku** Oriental Magpie-Robin (*Copsychus saularis*)  
Etelässä melko yleinen, varsinkin kun oppii pussitiaismaisen ääntelyn.
- Intiantasku** Indian Robin (*Saxicoloides fulicatus*)  
Etelässä yleinen.
- Kivikkoleppälintu** Blue-capped Redstart (*Phoenicurus caeruleocephala*)  
Nainitalin Snow View Topilla ja Pangotin retkellä yhteensä kolme lintua.
- Mustaleppälintu** Black Redstart (*Phoenicurus ochruros*)  
Etelässä siellä täällä muutamia lintuja.
- Louhikkoleppälintu** Blue-fronted Redstart (*Phoenicurus frontalis*)  
Nainitalissa Pangotin reissulla viitisen lintua.
- Virtaleppälintu** White-capped Water-Redstart (*Chaimarrornis leucocephalus*)  
Pohjoisessa jokaisella virtapaikalla. Ääni muistuttaa hyvin paljon rantasiipiä.
- Jokileppälintu** Plumbeous Water-Redstart (*Rhyacornis fuliginosa*)  
Pohjoisessa jokaisella virtapaikalla. Yleisempi kuin virtaleppälintu.
- Pikkuhaarapyrstö** Little Forktail (*Enicurus scouleri*)  
Nainitalin alarinteillä yhdellä jyrkällä purolla yksittäinen lintu.
- Pitsihaarapyrstö** Spotted Forktail (*Enicurus maculatus*)  
Kumerian alueella yhdellä jyrkällä purolla kaksi lintua (toinen oli pyrstötön) sekä yksi lintu Nainitalin alarinteillä Sat Talissa.
- Kaulustasku** Hodgson's Bushchat (*Saxicola insignis*)  
Vähintään kolme lintua Corbettissa Dhikalan leirin länsipuolisella ruohotasangolla.

- Mustapäätasku** Siberian Stonechat (*Saxicola (torquata) maura*)  
Melko yleinen Corbettissa, Nainitalissa, Chambalilla ja Bharatpurissa.
- Nokitasku** Pied Bushchat (*Saxicola caprata*)  
Chambalin ja Bharatpurin alueella siellä täällä, yhteensä muutama kymmenen lintua.
- Harmaatasku** Grey Bushchat (*Saxicola ferrea*)  
Pohjoisessa joka päivä muutamia lintuja.
- Aavikkotasku** Desert Wheatear (*Oenanthe deserti*)  
Pohjoisessa Kosi Riverillä ja Chambalin rannalla yksittäinen lintu. Ranthambhoreassa Soorwalin padon seuduilla 25 lintua.
- Arotasku** Isabelline Wheatear (*Oenanthe isabellinus*)  
Ranthambhoreassa Soorwalin padon seuduilla vähintään 10 lintua.
- Louhikkotasku** Variable Wheatear (*Oenanthe picata*)  
Pohjoisessa Kosi Riverillä yksittäinen lintu, ja Ranthambhoreassa viisi lintua.
- Pihatasku** Brown Rock-Chat (*Cercomela fusca*)  
Delhin ja Agran seuduilla muutama, Ranthambhoreassa enemmän. Kulttuurinsuosija.
- Bramiinikottarainen** Brahminy Starling (*Sturnus pagodarum*)  
Pohjoisessa Kosi Riverillä pari lintua, etelässä siellä täällä useampia.
- Punakottarainen** Rosy Starling (*Sturnus roseus*)  
Ranthambhoreassa Soorwalin padon tienoilla yksi noin 40 linnun parvi.
- Kyläkottarainen** Asian Pied Starling (*Sturnus contra*)  
Etelässä yleinen ja paikoin jopa runsas.
- Pihamaina** Common Myna (*Acridotheres tristis*)  
Yleinen ja hyvin runsas kaikkialla, havaintoja päivittäin reissun aikana. Ehkä matkan näkyvin lintu.
- Intianmaina** Bank Myna (*Acridotheres ginginianus*)  
Etelässä yleinen, mutta ei missään niin runsas kuin pihamaina.
- Aasiannakkeli** Chestnut-bellied Nuthatch (*Sitta castanea*)  
Pohjoisen metsäseuduilla muutamia lintuja päivässä.
- Himalajannakkeli** White-tailed Nuthatch (*Sitta himalayensis*)  
Nainitalissa ja Pangotin seuduilla yhteensä kymmenen lintua.
- Mustaotsanakkeli** Velvet-fronted Nuthatch (*Sitta frontalis*)  
Kumerian ja Corbettin metsissä yleinen ja melko runsas.
- Kalliokiipijä** Wallcreeper (*Tichodroma muraria*)  
Kosi Riverin rantakivikoissa molemmilla käynneillä yksi lintu ja lisäksi yksi lintu Kumerian lähetyvillä kallioseinämällä.

<b>Raitapyrstökiipijä</b>	Bar-tailed Treecreeper	( <i>Certhia himalayana</i> )
Pohjoisen metsäalueilla päivittäin muutamia lintuja.		
<b>Pakistanintöyhtötiainen</b>	Spot-winged Tit	( <i>Parus melanolophus</i> )
Nainitalin ja Pangotin metsissä yhteensä kymmenen lintua.		
<b>Talitiainen</b>	Great Tit	( <i>Parus major</i> )
Pohjoisessa useampia lintuja päivittäin ja Ranthambhoressa yhteensä kymmenen. Meikäläistä talitiaista selvästi hailakamman värinen, jopa harmaa.		
<b>Vihertalitiainen</b>	Green-backed Tit	( <i>Parus monticolus</i> )
Corbetin metsissä muutama ja Nainitalin alueella kymmenittäin.		
<b>Intianharjatiainen</b>	Black-lored Tit	( <i>Parus xanthogenys</i> )
Kumerian ja Corbettin metsissä muutamia.		
<b>Kerttutiainen</b>	Yellow-browed Tit	( <i>Sylviparus modestus</i> )
Kumerian alueella yksi, samoin kuin Nainitalin Snow View Pointilla.		
<b>Harlekiinipyrstötiainen</b>	Black-throated Tit	( <i>Aegithalos concinnus</i> )
Kumerian alueella ja Nainitalissa muutamia kymmeniä. Sympaattisen näköinen otus.		
<b>Pikkutörmäpääsky</b>	Plain Martin	( <i>Riparia paludicola</i> )
Yleinen ja paikoin runsas lähes koko reissun varrella.		
<b>Törmäpääsky</b>	Sand Martin	( <i>Riparia riparia</i> )
Muutama havainto Kosi Riverillä, Ramnagarin padolla ja Bharatpurissa.		
<b>Kalliopääsky</b>	Eurasian Crag Martin	( <i>Hirundo rupestris</i> )
Viisi lintua Nainitalin alarinteillä.		
<b>Aasiankalliopääsky</b>	Dusky Crag-Martin	( <i>Ptyonoprogne concolor</i> )
Bharatpurissa ja Ranthambhoressa päivittäin muutamia lintuja.		
<b>Haarapääsky</b>	Barn Swallow	( <i>Hirundo rustica</i> )
Lähes joka päivä reitin varrella, yleinen ja paikoin runsas.		
<b>Jouhipääsky</b>	Wire-tailed Swallow	( <i>Hirundo smithii</i> )
Bharatpurissa ja Bund Bharetan järvellä yhteensä 15 lintua.		
<b>Ruostepääsky</b>	Red-rumped Swallow	( <i>Hirundo daurica</i> )
Lähes koko matkan varrella, paikoitellen jopa runsas.		
<b>Töyhtöhuppubulbuli</b>	Black-crested Bulbul	( <i>Pycnonotus melanicterus</i> )
Yksi pikainen havainto ohi lentävästä linnusta Corbettissa.		
<b>Punaposkibulbuli</b>	Red-whiskered Bulbul	( <i>Pycnonotus jocosus</i> )
Corbettissa yhtenä päivänä kaikkiaan 15 lintua.		
<b>Valkoposkibulbuli</b>	White-eared Bulbul	( <i>Pycnonotus leucotis</i> )
Etelässä päivittäinen ja yleinen, paikoin jopa runsas.		

<b>Himalajanbulbuli</b>	Himalayan Bulbul	( <i>Pycnonotus leucogenys</i> )
Pohjoisessa päivittäinen, hyvin yleinen ja hyvin runsas.		
<b>Punaperäbulbuli</b>	Red-vented Bulbul	( <i>Pycnonotus cafer</i> )
Päivittäin reissun aikana, kaikkialla yleinen ja hyvin runsas. Yleisin bulbuli reissulla.		
<b>Kultasiipibulbuli</b>	Ashy Bulbul	( <i>Hemixos flavala</i> )
Kumerian ja Corbettin alueella yhteensä vajaa 30 lintua.		
<b>Punanokkabulbuli</b>	Black Bulbul	( <i>Hypsipetes leucocephalus</i> )
Nainitalin alarinteillä ja Sat Talin metsissä yhteensä 50 lintua.		
<b>Heinäkerttu</b>	Zitting Cisticola	( <i>Cisticola juncidis</i> )
Yksi havainto pyrähtelevästä linnusta Corbettin heinätasangolla.		
<b>Viirupriinia</b>	Striated Prinia	( <i>Prinia criniger</i> )
Pari havaintoa Nainitalissa Pangotin seudulla ja Sat Talissa.		
<b>Savupriinia</b>	Grey-breasted Prinia	( <i>Prinia hodgsonii</i> )
Pohjoisessa sekä Ranthambhoressa päivittäin alle kymmenen lintua.		
<b>Priinia</b>	Graceful Prinia	( <i>Prinia gracilis</i> )
Yksi lintu Bharatpurin seudulla.		
<b>Viidakkopriinia</b>	Jungle Prinia	( <i>Prinia sylvatica</i> )
Yksi lintu Ranthambhoren linnoituksella.		
<b>Sinipriinia</b>	Ashy Prinia	( <i>Prinia socialis</i> )
Joitakin lintuja Chambalilla ja Bharatpurissa.		
<b>Intiantuhkapriinia</b>	Plain Prinia	( <i>Prinia inornata</i> )
Corbettissa melko runsas, etelässä päivittäin muutamia lintuja.		
<b>Aasianrilli</b>	Oriental White-eye	( <i>Zosterops palpebrosus</i> )
Pohjoisessa yleinen ja runsas. Isommat parvet hallitsi aamujen äänimailmaa urpiaismaisella käytöksellä ja ääntelyllä.		
<b>Keltapittakerttunen</b>	Chestnut-headed Tesia	( <i>Tesia castaneocoronata</i> )
Yksi lintu Kumeriassa Mohanin kappelin vieressä.		
<b>Kenttäkerttunen</b>	Paddyfield Warbler	( <i>Acrocephalus agricola</i> )
Kaksi lintua Bharatpurin aamuretkillä.		
<b>Pitkäpyrstöräätäli</b>	Common Tailorbird	( <i>Orthotomus sutorius</i> )
Muutamia lintuja siellä täällä koko matkan varrella.		
<b>Tiltalti</b>	Siberian Chiffchaff	( <i>Phylloscopus collybita tristis</i> )
Pohjoisessa ja Chambalilla siellä täällä muutamia lintuja.		
<b>Himalajanuunilintu</b>	Buff-barred Warbler	( <i>Phylloscopus pulcher</i> )
Nainitalissa ja Pangotin seudulla kaikkiaan kymmenkunta lintua.		

- Tiibetinuunilintu** Lemon-rumped Warbler (*Phylloscopus chloronotus*)  
Pohjoisessa hyvin yleinen ja paikoin runsas. Kuului vahvasti alueen äänimaailmaan.
- Kashmirinuunilintu** Hume's Warbler (*Phylloscopus humei*)  
Hyvin yleinen koko reissun aikana, pohjoisessa runsaampi. Kuului vahvasti alueen äänimaailmaan.
- Taigauunilintu** Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*)  
Yksi äänitelevä ja nähty lintu Kumeriassa Mohanin kappelin luona. Kirjan mukaan alueella hyvin harvinainen.
- Idänuunilintu** Greenish Warbler (*Phylloscopus trochiloides*)  
Etelässä yleinen ja ääniä kuului sieltä täältä päivittäin.
- Afganistaninuunilintu** Brook's Leaf Warbler (*Phylloscopus subviridis*)  
Chambalin aamuretkeillä neljä aktiivisesti äänitelevää lintua.
- Kivikkouunilintu** Sulphur-bellied Warbler (*Phylloscopus griseolus*)  
Yksi lintu Ranthambhoren linnoituksella. Oppaan mukaan uusi havainto alueelle.
- Hippiäinen** Goldcrest (*Regulus regulus*)  
Nainitalin metsissä yhteensä parikymmentä.
- Himalajansieppokerttu** Grey-hooded Warbler (*Seicercus xanthoschistos*)  
Pohjoisen metsissä yleinen ja paikoin runsas.
- Kastanjasieppokerttu** Chestnut-crowned Warbler (*Seicercus castaniceps*)  
Corbettiin mennessä yksi lintu tien varren pikkulintusekaparvessa.
- Himalajannaurutimali** White-throated Laughingthrush (*Garrulax albogularis*)  
Corbettiin mennessä 30 lintua lennähti tien yli.
- Valkotöyhtötimali** White-crested Laughingthrush (*Garrulax leucolophus*)  
Kumerian ja Corbettin alueella päivittäin muutamia. Hienon näköinen lintu, mutta ääntely on lähes maanista naurua.
- Viirutöyhtötimali** Striated Laughingthrush (*Garrulax striatus*)  
Nainitalissa Pangotin rinteillä kolme lintua.
- Oranssikurkkutimali** Rufous-chinned Laughingthrush (*Garrulax rufogularis*)  
Kaikkiaan kolme lintua Nainitalissa Sat Talin alueella.
- Pikkunaurutimali** Streaked Laughingthrush (*Garrulax lineatus*)  
Nainitalissa melko yleinen ja runsas. "Rautiaistimali".
- Rastasviidakkotimali** Puff-throated Babbler (*Pellorneum ruficeps*)  
Kaksi lintua Kumerian alueella.
- Punakylkitimali** Rusty-cheeked Scimitar-Babbler (*Pomatorhinus erythrogenys*)  
Corbettin tiellä kolme lintua ja Nainitalissa Sat Talin alueella yksi lintu.
- Töpötimali** Scaly-breasted Wren-babbler (*Pnoepyga albiventer*)  
Kumerian alueella yksi lintu. Todella vaikeasti nähtävä pieni ja pyrstötön kähmyilijä.

- Pakistanintimali** Black-chinned Babbler (*Stachyris pyrrhops*)  
Corbettissa Dhikalan pihassa ja Nainitalin Sat Talin alueella muutamia lintuja.
- Pensastimali** Common Babbler (*Turdoides caudata*)  
Etelässä muutamia lintuja päivittäin.
- Isopensastimali** Large Grey Babbler (*Turdoides malcolmi*)  
Etelässä yleinen ja paikoin runsas. Ääntely hyvin mielenkiintoista "rähinää".
- Metsäpensastimali** Jungle Babbler (*Turdoides striata*)  
Hyvin yleinen ja paikoin hyvin runsas koko matkan varrella. Reissun näkyvin timali. Chambalilla tuli syömään pöydästä, ja jopa sisälle.
- Tulirintatimali** Red-billed Leiothrix (*Leiothrix lutea*)  
Nainitalissa Sat Talin metsiköissä yhteensä kolmisenkymmentä lintua.
- Lepinkäistimali** White-browed Shrike-babbler (*Pteruthius flaviscapis*)  
Kumerian alueella kolmen linnun parvi.
- Siniminla** Blue-winged Minla (*Minla cyanouroptera*)  
Corbettissa yhteensä 6 lintua.
- Himalajanpyrstötimali** Rufous Sibia (*Heterophasia capistrata*)  
Nainitalissa ja Pangotin alueella melko yleinen, kaikkiaan 30 lintua.
- Hernekerttu** Lesser Whitethroat (*Sylvia curruca*)  
Etelässä yleinen ja paikoin jopa runsas.
- Intianpensaskiuru** Indian Bushlark (*Mirafra erythroptera*)  
Ranthambhoren kuivalla kivikkoisella arolla kolme lintua.
- Intianvarpuskiuru** Ashy-crowned Sparrow-Lark (*Eremopterix griseus*)  
Chambalin rannoilla parikymmentä lintua ja Ranthambhoren kuivalla kivikkoisella arolla muutamia.
- Intianaavikkokiuru** Rufous-tailed Lark (*Ammomanes phoenicura*)  
Ranthambhoren linnoituksella ja kuivalla kivikkoisella arolla muutamia.
- Lyhytvarvaskiuru** Greater Short-toed Lark (*Calandrella brachydactyla*)  
Chambalin rannoilla ja Ranthambhoreessa Soorwalin padon lähellä satoja lintuja suurissa parvissa.
- Intianhietakiuru** Sand Lark (*Calandrella raytal*)  
Kaksi lintua Chambalin rannalla jokiristeilyllä.
- Töyhtökiuru** Crested Lark (*Galerida cristata*)  
Yhteensä puolenkymmentä lintua Chambalin rannalla.
- Aasiankiuru** Oriental Skylark (*Alauda gulgula*)  
Corbettissa Ramnagarjoen suistossa neljä lintua ja Bharatpurin kuivuneilla altailla, heinäarolla, noin 20 lintua.

<b>Kiuru</b>	Skylark	( <i>Alauda arvensis</i> )
Corbettissa Ramnagarjoen suistossa pari lintua.		
<b>Harmaaviirukukastaja</b>	Thick-billed Flowerpecker	( <i>Dicaeum agile</i> )
Nainitalissa Pangotin rinteillä yksi soidinta lentävä lintu.		
<b>Purppuramedestäjä</b>	Purple Sunbird	( <i>Nectarinia (Cinnyris) asiatica</i> )
Etelässä päivittäin, hyvin yleinen ja jopa runsaslukuinen.		
<b>Karmiinimedestäjä</b>	Crimson Sunbird	( <i>Aethopyga siparaja</i> )
Kumerian alueella The Denin lähistöllä pari lintua.		
<b>Varpunen</b>	House Sparrow	( <i>Passer domesticus</i> )
Päivittäin reissun aikana, yleinen ja ihmisten läheisyydessä runsas.		
<b>Kanelivarpunen</b>	Russet Sparrow	( <i>Passer rutilans</i> )
Nainitalissa Sat Talin alueella yhteensä kolme lintua.		
<b>Tarhavarpunen</b>	Chestnut-shouldered Petronia	( <i>Petronia xanthocollis</i> )
Etelässä yleinen, muutamia lintuja päivässä, enimmillään 20.		
<b>Västääräkki</b>	White Wagtail	( <i>Motacilla alba</i> )
Lähes päivittäin reissun aikana, yleinen, mutta ei missään kovin runsaslukuinen. Huomattavasti meikäläisestä poikkeava valkopäinen alalaji.		
<b>Mustavästääräkki</b>	White-browed Wagtail	( <i>Motacilla maderaspatensis</i> )
Useimmiten veden äärellä, lähes päivittäin. Yleinen, mutta ei kovin runsas missään.		
<b>Sitruunavästääräkki</b>	Citrine Wagtail	( <i>Motacilla citreola</i> )
Corbettissa muutamia lintuja, Chambalilla kymmeniä ja Bharatpurissa satoja.		
<b>Keltavästääräkki</b>	Yellow Wagtail	( <i>Motacilla flava</i> )
Kosi Riverillä muutama ja Bharatpurissa kymmeniä.		
<b>Virtavästääräkki</b>	Grey Wagtail	( <i>Motacilla cinerea</i> )
Etenkin pohjoisessa, mutta myös paikoin etelässä. Muutamia siellä täällä veden äärellä.		
<b>Riisikirvinen</b>	Paddyfield Pipit	( <i>Anthus rufulus</i> )
Paikoitellen matkan varrella muutamia. Kosi Riverillä yhteensä kymmenkunta lintua.		
<b>Nummikirvinen</b>	Tawny Pipit	( <i>Anthus campestris</i> )
Paikoitellen matkan varrella muutamia. Etelässä hivenen riisikirvistä yleisempi.		
<b>Kalliokirvinen</b>	Long-billed Pipit	( <i>Anthus similis</i> )
Kosi Riverillä, Corbettissa ja Bharatpurissa yhteensä alle kymmenen havaintoa.		
<b>Metsäkirvinen</b>	Tree Pipit	( <i>Anthus trivialis</i> )
Corbettissa ja Chambalissa päivittäin toistakymmentä lintua.		
<b>Taigakirvinen</b>	Olive-backed Pipit	( <i>Anthus hodgsoni</i> )
Corbettin ja Nainitalin alueella sekä Chambalilla useampia lintuja päivässä. Nainitalissa yleinen.		

---

<b>Himalajankirvinen</b> Yksi lintu Kosi Riverillä.	Rosy Pipit	( <i>Anthus roseatus</i> )
<b>Louhikkorautiainen</b> Pari lintua Nainitalissa Pangotin rinteillä.	Rufous-breasted Accentor	( <i>Prunella strophciata</i> )
<b>Bengalinkutoja</b> Kolme lintua Chambalin majoituksen takapihalla.	Black-breasted Weaver	( <i>Ploceus benghalensis</i> )
<b>Riisikutoja</b> Pari lintua Chambalin majoituksen takana ja kymmenen lintua Ranthambhoressa.	Baya Weaver	( <i>Ploceus philippinus</i> )
<b>Vahanokka</b> Kymmenen lintua Corbettissa ja 15 lintua Bund Bharetan padolla.	Red Avadavat	( <i>Amandava amandava</i> )
<b>Idänhopeanokka</b> Etelässä siellä täällä muutamia lintuja.	White-throated Silverbill	( <i>Lonchura malabarica</i> )
<b>Suomumanikki</b> Corbettissa Dhikalan lähetyvillä tiellä kymmenen lintua.	Scaly-breasted Munia	( <i>Lonchura punctulata</i> )
<b>Aasianvihervarpunen</b> Nainitalissa Pangotin ja Sat Talin seuduilla kaikkiaan parisenkymmentä lintua.	Yellow-breasted Greenfinch	( <i>Carduelis spinoides</i> )
<b>Punavarpunen</b> Corbettissa ja Nainitalissa Sat Talin alueella molemmissa 15 lintua.	Common Rosefinch	( <i>Carpodacus erythrinus</i> )
<b>Himalajanpunavarpunen</b> Nainitalissa Pangotin kylän pelloilla yksi komea lintu.	Pink-browed Rosefinch	( <i>Carpodacus rodochroa</i> )
<b>Tamminokkavarpunen</b> Nainitalissa Pangotin tiellä kaikkiaan kuusi lintua. Kokeneelle oppallekin uusi ja yllättävä tuttavuus.	Collared Grosbeak	( <i>Mycerobas affinis</i> )
<b>Sulttaanisirkku</b> Yksi naaras lintu Corbettissa Ramngangajoen rantakivikossa.	Crested Bunting	( <i>Melophus lathami</i> )
<b>Vuorisirkku</b> Ranthambhoren kuivalla kiviarella yksi lintu.	Rock Bunting	( <i>Emberiza cia</i> )
<b>Mustakurkkusirkku</b> Nainitalin Pangotin alueella yhteensä vajaa parikymmentä lintua.	White-capped Bunting	( <i>Emberiza stewarti</i> )

**Lista muista havaituista eläimistä:**

**Reesusmakaki**                      Rhesus Monkey                      (*Macaca mulatta*)

Yleinen ja runsaslukuinen pohjoisessa. Corbettissa olivat oppineet rötöstelemään.

**Hanumaani**                      Hanuman Langur                      (*Semnopithecus entellus*)

Yleinen kaikkialla, mutta etelässä runsaampi. Etenkin Ranthambhoren linnoituksella oli rötösteleviä ja röyhkeitä yksilöitä.

**Bengalintiikeri**                      Tiger                      (*Panthera tigris*)

Havaittiin kaksi kertaa Corbettissa. Toisella kerralla nähtiin vain tien ylittävän eläimen takalisto, mutta toisella kerralla nuori tiikeri lepäili tiheään aluskasvillisuuden keskellä vain kymmenen metrin päässä ja lähti kohta kauemmaksi. Corbetissa kuultiin useita kertoja hanumaanien ja aksiskauriiden varoitteluja. Ranthambhoreissa havaittiin vain tiikerin jälkiä hietikolla.

**Leopardi**                      Leopard                      (*Panthera pardus*)

Yksi todella komeasti ja melko läheltä havaittu eläin Ranthambhoreissa.

**Juovahyeena**                      Striped Hyena                      (*Hyaena hyaena*)

Ranthambhoreissa vain toinen autokunta onnistui havaitsemaan tämän hienon eläimen.

**Kultasakaali**                      Golden Jackal                      (*Canis aureus*)

Corbettissa muutamia eläimiä. Bharatpurissa yleisesti nähty ja äänessä iltaisin majapaikan parvekkeen alla. Herättivät lähes joka yö ulvomisellaan.

**Keltakurkkunäätä**                      Yellow-throated Marten                      (*Martes flavigula*)

Yksi pikaisesti jeepin editse juossut eläin Corbettissa.

**Kaljulenkkö**                      Indian Flying Fox                      (*Pteropus giganteus*)

Vanhalta nimeltään intianlentäväkoira. Chambalin majapaikan pihapuissa roikkui päivisin aina useampia eläimiä. Lennossa muistuttaa hieman jotain haikaraa.

**?lepakko**                      ? Bat

Chambalissa, Bharatpurissa ja Ranthambhoreissa havaittiin kaikkiaan kolme lajia erikokoisia lepakoita. Tarkempaan määrittelyyn havainnot eivät kuitenkaan riitä.

**?hiiri**                      ? Mouse

Nainitalissa tien yli juoksi pikaisesti jokin pienehkö ja pitkähäntäinen hiiri.

**Pakistaninpalmuorava**                      Northern Palm Squirrel                      (*Funambulus pennantii*)

Hyvin yleinen ja paikoin runsaslukuinen etelässä, etenkin paikoilla missä ihmiset ruokki niitä eli Taj Mahalilla ja Ranthambhoren linnoituksella.

**Mustakaulajänis**                      Indian Hare                      (*Lepus nigricollis*)

Muutamia siellä täällä, etenkin Bharatpurissa.

**Aasiannorsu**                      Asiatic Elephant                      (*Elephas maximus*)

Arviolta puolenkymmentä eläintä Corbettissa.

<b>Villisika</b>	Wild Boar	( <i>Sus scrofa</i> )
Corbettissa yhteensä arviolta parikymmentä eläintä.		
<b>Persiangeselli</b>	Indian Gazelle	( <i>Gazella bennettii</i> )
Ranthambhoren aamuisella tiikerisafarilla kaksi eläintä. Yksi reissun hienoimmista nisäkkäistä.		
<b>Besoaarigaselli</b>	Blackbuck	( <i>Antilope cervicapra</i> )
Ranthambhoreessa Soorwalin padon lähellä yksi koiras yksilö.		
<b>Nilgai</b>	Nilgai	( <i>Boselaphus tragocamelus</i> )
Chambalilla, Bharatpurissa ja Ranthambhoreessa melko yleinen, yhteensä parikymmentä yksilöä.		
<b>Sambar</b>	Sambar	( <i>Cervus unicolor</i> )
Corbettissa ja Ranthambhoreessa melko yleinen, yhteensä kymmeniä yksilöitä.		
<b>Aksiskauris</b>	Axis Deer	( <i>Axis axis</i> )
Selvästi yleisin kaurislaji Corbettissa ja Ranthambhoreessa. Paikoin suurina laumoina, joten yhteismäärä useampia satoja eläimiä.		
<b>Rytökauris</b>	Hog Deer	( <i>Axis porcinus</i> )
Corbettissa aksiskauriiden joukossa muutamia eläimiä.		
<b>Muntjakki</b>	Indian Muntjac	( <i>Muntiacus muntjak</i> )
Selvästi aroin hirvieläin. Corbettissa havaittiin muutamia yksilöitä ja yksi havaittiin Nainitalin alarinteillä Sat Talissa.		
<b>Gangesindelfiini</b>	Ganges River Dolphin	( <i>Platanista gangetica</i> )
Ainakin kolme eri eläintä Chambalin jokiristeilyllä. Todella hieno ja uhanalainen laji.		
<b>Intianpython</b>	Indian Rock Python	( <i>Python mularis</i> )
Bharatpurissa havaittiin juuri koloon liukuva käärme, joka oli "vain" 4-5 metrinen.		
<b>Bengalinvaraani</b>	Bengal Monitor	( <i>Varanus bengalensis</i> )
Bharatpurissa havaittiin yksi tiellä lämmittelevä lisko.		
<b>Suokrokotiili</b>	Mugger Crocodile	( <i>Crocodylus palustris</i> )
Muutama krokotiili havaittiin jo Corbettissa Ramngangajoella. Chambalin jokiristeilyllä ehkä toistakymmentä yksilöä. Lisäksi havaittiin muutama Ranthambhoren linnoituksen alapuolisella järvellä.		
<b>Gangesingaviaali</b>	Ghrial	( <i>Gavialis gangeticus</i> )
Muutama gaviaali havaittiin jo Corbettissa Ramngangajoella. Chambalin jokiristeilyllä yleinen ja runsaslukuinen, kaikkiaan havaittiin ehkä 40 eläintä.		
<b>Kotigekko</b>	Northern House Gecko	( <i>Hemidactylus flaviviridis</i> )
Chambalilla ja Ranthambhoreessa muutama yksilö asumuksissa ja ruokatiloissa.		
<b>?kilpikonna</b>	Indian Roofed Turtle	( <i>Kachuga tecta</i> )
Tämä laji havaittiin ja kuvattiin ainakin Chambalin jokiristeilyllä. Jotain kilpikonnaa havaittiin lisäksi Corbettissa Ramngangajoella sekä Ranthambhoren linnoituksen alapuolisella järvellä.		

**Mustaharjannekonna** Common Indian Toad (*Duttaphrynus melanostictus*)

Yksi polulla ollut yksilö havaittiin Kumeriassa The Denin lähistöllä.

Lisäksi havaittiin erilaisia kaloja arviolta ainakin puolenkymmentä lajia.

---

Copyright © Ville Suorsa 2010  
ville.suorsa@gmail.com  
<http://vilsu.kuvat.fi>